



ZKI vetőmag

Vetőmag termékkatalógus





Syn. Cecei
 Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány-mozaikvírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas.

kategória: 4

Fehérözön
 Determinált növekedésű, lombos bokra 25-40 cm magas, jó megújuló képességű. Fényhiányra nem érzékeny. Termése tölteni való, felálló, édes, fehér, kúp alakú, tömege 80-90 g. Hajtásra, szabadföldi termesztésre, helyreállításra ajánlott. Friss fogyasztásra, feldolgozásra alkalmas.



kategória: 4



Tizenegyes
 Gyors fejlődésű, bőtermő, 25-30 cm magas determinált fajta. Különlegessége a sötétzöld lombja, igen jó ellenálló képességű. Fényhiányra nem érzékeny. Hajtásra, szabadföldi termesztésre, helyreállításra ajánlott. Friss fogyasztásra alkalmas.

kategória: 3

Cecil F1
 Folytonnövő, közepes növekedésű, rövid ízközű bokor. Fejlődési sebessége gyors, fényhiányra nem érzékeny. A dohánymozaikvírus új törzseivel szemben is ellenálló (Tm2). Termése fehér, 120-140 g tömegű, nyújtott, csúcsban végződő, csípőségtől mentes.



kategória: 1

Gigant F1
 Termése sötétzöld, nagytestű. Csüngő 150-200 g tömegű paprikákat terem. Vastag húszú, begyűrt végű bogói biológiai érettségben pirosak. Hajtásra és szabadföldi termesztésre is alkalmas. Nagyon bőtermő, termése folyamatosan szedhető zölden és pirosan egyaránt.

kategória: 1



Brillant F1
 Hajtásra és szabadföldi termesztésre kiváló, fehér blocky típusú hibrid. Folytonnövő, erőteljes, 130-150 cm magasra megnövő paprika. A dohány mozaik vírus új törzseivel szemben is ellenálló. Termése fehér, csüngő helyzetű, csípőségtől mentes, három vagy négy rekeszű, 120-130 g tömegű. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló.

kategória: 1



CAT.: 1.

Javított bogyzslói

Folytonnövő, elterülő bokrú, 40 cm magas. Termése fehér, szabályos kúp alakú, felálló, kellemesen csípős. 50-55 g tömegű, kiváló ízű paprika. Fejlődési sebessége gyors. A szárazságot jól tűri. Szabadföldi termesztésre ajánljuk. Friss fogyasztásra és savanyított feldolgozásra alkalmas.

kategória: 3



Édesalma

Folytonnövő, közepméretű, gyors fejlődésű típus. Termése alma alakú, lapított gömb, csüngő, sárgásfehér, édes, tömege 55-60 g. Az ecetes és savanyított készítmények csípőségmentes paprikája. Friss fogyasztásra is alkalmas.

kategória: 3

Almapaprika

Szabadföldi termesztésre ajánlott, vastag húsu, kellemesen csípős paprika Folytonnövő. Termése fehér, lapos, alma alakú, tömege 40-45 g. Friss fogyasztás mellett konzervipari feldolgozásra, savanyításra is alkalmas.



kategória: 3

Kurtovszka kápia

Folytonnövő, erőteljes növekedésű. Bogyója nagy, enyhén lapított. Zöldből pirosba érő "kápia" típusú paprika. Vastag húsu, édes. Szedés után hetekig is eltartható. Természsúlya 120-180 g. Szabadföldi termesztésre és fólia alatti hajtásra is alkalmas.



Greygo

Folytonnövő, erőteljes növekedésű, 40-45 cm magas bokrú, paradicsompaprika. Termése sötétzöld, éretten sötétpiros, csüngő, édes ízű, tömege 130-140 g. Magházpenészedésre nem hajlamos. Szabadföldi termesztésre és támrendszeres hajtásra ajánlott.

kategória: 4

Sobor

Folytonnövő, erőteljes növekedésű, 45-50 cm magas. Termése halványzöld, igen nagy, kissé szabálytalan kúp alakú, enyhén csípős. Fejlődési sebessége gyors, fényhiányra közepesen érzékeny. Hajtásra és szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas. Friss fogyasztásra ajánljuk.



kategória: 3

Albaregia

Szabadföldi termesztésben az egyik legnagyobb bogyójú paprika. Folytonnövő típus. Lombozata terebélyes, szilárd ágrendszer jellemzi. Fényhiányra érzékeny. Termése tölteni való, begyűrten végződő, felálló, édes, fehér. A bogyók tömege 90-100 g. Friss fogyasztásra, feldolgozásra alkalmas.



Kecskeszarv

Különleges típus. Régi magyar fajta. Folytonnövő, magas, fényhiányra nem érzékeny. Termése világoszöld, hosszú, hegyes, csípős, tömege 20-25 g. Korai hajtásban is jól köt. Szabadföldön is termesztethető. Friss fogyasztásra és ecetes paprikának is alkalmas.



Rapires F1

Folytonnövő hibrid. Fejlődési sebessége gyors, fényhiányra nem érzékeny. Termése hosszú, hegyes, világoszöld. Íze intenzíven csípős. A bogyók csüngő helyzetűek, 40-50 g tömegűek. Minden időszakban termesztethető. Elsősorban támrendszeres hajtásra ajánljuk.



Táltos

Folytonnövő, tölteni való, fehér paprika. Termése 10-12 cm hosszú, 6-8 cm vállszélességű, vastag húsú bogyó. Nagyon jó stressztűrő és általános ellenálló képességgel rendelkező fajta, mely uborkamozzaik vírussal (CMV) szemben bizonyos fokú toleranciával rendelkezik.



Macska piros

Folytonnövő típus, szabadföldi termesztésre ajánlott fajta. Termése apró, hosszú, hegyes, csípős, csüngő. Középszőlőből pirosba érő, tömege 9-10 g. Felfűzésre, ételízesítésre alkalmas.



Elefántormány

Különleges típus. Folytonnövő, magas bokrú, 50-60 cm-es, bőtermő, fényhiányra nem érzékeny. Termése igen tetszetős, hosszú, elefántormányhoz hasonló, édes, csüngő, világoszöld, tömege 40-45 g. Hajtatásra, szabadföldi termesztésre ajánlott.



Kalocsai alacsony cseresznye

Csüngő termésállású, rövid szárelágazású, csípős cseresznyepaprika. Bokra 35–45 cm magas. Termései 2–3 cm átmérőjűek, lapított gömb alakúak. Éretten sötétpiros, átlagtömegük 4–7 g. Vírusbetegségekkel szemben ellenálló. Középkorai érésű, gyors éréslefutású. Termései kemények, a tárolást jól tűrik. Fel-fűzésre és fűszerezésre alkalmas.



Szegedi 80

Csüngő termésállású, csípősség nélküli fajta. Bogyója 12–14 cm hosszú, éretten sötétpiros. Betegségekkel szembeni toleranciája megfelelő. Helyre vetve és ültetve is sikeresen termeszthető. Korai érése miatt terméshozottsága igen jó.



Szegedi 178

Csüngő termésállású, csípős fajta. Bogyója az erek mentén kissé lapított, enyhén behorpadó. Vége kissé tompa, 10–12 cm hosszú. Színe éretten élénkpiros. Betegségekkel szemben ellenálló. Helyre vetve és palántázva is sikeresen termeszthető. Csípős örlemény és paprikakrém gyártásra egyaránt alkalmas.



Palotás F1

Csípmentes, folytonos növekedésű. Erős, kiterjedt gyökérzettel rendelkezik. Nagyméretű, csüngő bogyóval, magas hozammal, jó stressz toleranciával rendelkezik. Képes tövenként 20 feletti darabszámot produkálni.



Hírös F1

Csüngő termésállású, csípős fajta. Bogyója az erek mentén kissé lapított, enyhén behorpadó. Vége kissé tompa, 16–18 cm hosszú. Színe éretten élénkpiros. Betegségekkel szemben ellenálló. Helyre vetve és palántázva is sikeresen termeszthető. Csípős örlemény és paprikakrém gyártásra egyaránt alkalmas.



Kaldóm

Csípősség nélküli, felálló terméssű, féldeterminált fajta. Bokra 40–45 cm magas, merev szárú. Termése 12–15 cm hosszú, kiváló szín és zamat jellemzi. Rövid tenyészidejű, közepes érésű, elsősorban helyre vetésére ajánlott fajta. Jó minőségű örleményalapanyag készítésére alkalmas.



Lugas F1

Házikertben támrendszer melletti termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra alkalmas folytonos növekedésű hibrid. Bogyói egy színből érnek, megnyúlt gömb alakúak, 60-70 g tömegűek. Igen jó ízű, kemény, jól szállítható. Verticilliumos, fuzáriumos tőhervadásznak és dohánymozzaikvírus fertőzésnek ellenáll.

kategória: 2



Cherrola F1

Középerős növekedésű, korai érésű koktélpáradicsom. Szabadföldön és fólia alatt egyaránt termesztendő. A tövek folytonnövők, nyitott lombozatúak. A bogyók átlagos tömege 15-20 g. Egy fűrtben körülbelül 20 bogyó terem. Hervadásos betegségeknek ellenáll.

kategória: 2



Kecskeméti-3 F1

Fűtetlen fólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas, determinált növekedésű hibrid. Alacsony hőmérsékleten is jól köt. Termőképessége kiváló, tápanyagigényes. Igen korai érésű, tenyészideje vetéstől az első termés éréséig 105-110 nap.

kategória: 2



Korall

Közepes tenyészidejű (125-130 napos) szabadföldi termesztésre ajánlott. A legjobb ízű paradicsomfajta. Determinált növekedésű, erőteljes bokrot képez. Bogyói 20-130 g tömegűek, a szállítást jól bírják. Verticilliumos és fuzáriumos tőhervadásznak ellenáll.

kategória: 4



Manó

Korai szabadföldi termesztésre ajánlott, 35-45 cm magasra növő, erős szárrendszerű, determinált növekedésű paradicsomfajta. Rendkívül korai, gyors fejlődésű. Koraisága az első szabadföldi paradicsomtermést biztosítja. Friss fogyasztásra alkalmas házikerti fajta.

kategória: 4



Vilma
Korai érésű, cserépben és balkonládában is nevelhető paradicsom. Szabadföldi, fólia alatti és lakásablakban való termesztésre egyaránt alkalmas. A tövek nagyon alacsony növekedésűek, ezért a kiskertek ideális növénye. A bogyók átlagos tömege 15-20 g.

Zömök
Elsősorban házikerti termesztésre ajánlott salátaparadicsom. Determinált növekedésű. Igen jól kötődő, korai érésű. A kemény bogyók rothadásnak ellenállnak, sokáig a száron tarthatók, repedésre nem hajlamosak. Fuzáriumos tőhervadásnak ellenáll.



Mobil
Középkései tenyészidejű szabadföldi fajta. Determinált növekedésű, erőteljes lombozatú. Bogyói 120-140 g tömegűek. Frisspiaci, házikerti termesztésre és sűrítmény gyártásra egyaránt alkalmas. Verticilliumos és fuzáriumos tőhervadásnak ellenáll.



San Marzano
Középkorai érésű, igen bőtermő, determinált növekedésű fajta. Klasszikus olasz lucullus típusú, szilva alakú paradicsom. Kifejezetten jó ízű, vékony héjú, friss fogyasztásra és salátának alkalmas paradicsom.



Kecskeméti 549
Determinált növekedésű, középkorai fajta. Bogyói egy színből érnek, kissé megnyúlt, hengeres alakúak, kocsánymentesen válnak le, tömegük 50-60 g. Helyre vetéssel is termeszthető. Verticilliumos és fuzáriumos tőhervadásnak ellenáll.

Kecskeméti jubileum
Kiváló termőképességű és minőségű szabadföldi fajta. Determinált, erős növekedésű. Nagy bogyói enyhén lapított gömb alakúak, egyidőben érők, sokrekeszűek, 110-120 g tömegűek. Házikerti termesztésre, friss fogyasztásra és befőzésre javasolt, jó ízű paradicsom.





ZKI vetőmag
Partenokarp, ellenálló, tömör hús

UBORKA · CASTRAVETE · UHORKY · KRASTAVAC

Szatmár F1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1g

kategória: 2

Szatmár F1
Aprótüskés konzervuborka hibrid. Középkorai, növekedési erélye és oldalhajítás képzése erős. Támrendszeres és intenzív síkműveléses természetűre egyaránt ajánlott. Betegségekkel szemben ellenálló, költséghatékonyan termeszthető. Kiváló csemegeuborka készíthető belőle.

ZKI vetőmag
Peronoszpóra ellenálló

UBORKA · CASTRAVETE · UHORKY · KRASTAVAC

Mohikán F1

I II III IV V VI VII VIII

1.5g

kategória: 2

Mohikán F1
Középkorai érésű, egyenletes érés-lefutású, konzervuborka hibrid. Túlnyomórészt nővirágú. Lombja középzöld, növekedése középérésű. Kifejezetten apró méretben való szedésre ajánljuk. Peronoszpórával és lisztharmattal szemben az egyik legellenállóbb hibrid.



ZKI vetőmag
Kigyóuborka, hajtatásra is

UBORKA · CASTRAVETE · UHORKY · KRASTAVAC

Ritmo F1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

10 PCS

kategória: 1

Ritmo F1
Üvegházi és fűtött fóliás hajtatásra alkalmas. Tiszta nővirágú partenokarp uborka, megporzás nélkül is termés képződik rajta. Korai, rövid tenyészidejű, középérésű növekedésű, nagy termőképességű, keseredésmentes kígyóuborka. Termése sötétzöld, rövid nyakú, enyhén bordázott, 32-35 cm hosszú. Mézgas varasodásnak ellenáll.

ZKI vetőmag
Jó minőség, sík művelésre

UBORKA · CASTRAVETE · UHORKY · KRASTAVAC

Tétény F1

I II III IV V VI VII VIII

2g

CAT.: 2.

kategória: 2

Tétény F1
Apró, tüskés, túlnyomóan nővirágú, középérésű konzervuborka fajta. Termései mélyzöld színűek, keseredésmentesek, kifejezetten kemény húsúak, tartósítás után is ropogósak maradnak. Magháza kicsi. Szédése kis és közepes méretben ajánlott. Peronoszpórával, lisztharmattal és uborka mozaik vírussal szemben ellenálló.

ZKI vetőmag
Kiváló termőképesség

UBORKA · CASTRAVETE · UHORKY · KRASTAVAC

Perez F1

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.5g

CAT.: 2.

kategória: 2

Perez F1
Növekedése erőteljes, sötétzöld lombú, egyenletes éréslefordulású. Túlnyomóan nővirágú konzervuborka hibrid. Termése sötétzöld, finom tüskés, karcsú, keseredésmentes. Peronoszpórával és lisztharmattal szemben az egyik legellenállóbb hibrid. Síkművelésre és támrendszeres termesztésre egyaránt alkalmas.



Barbara F1

Sík - és támrendszeres természetűre alkalmas. Keseredésmentes konzervuborka hibrid. Intenzív körülményeket igényel. Egészséges lombozata a tenyésztő végéig nagy termőképességet biztosít. Termése sötétzöld, tetszetős, jó alaktartó, enyhén bordázott, finoman szemölcsös.

kategória: 4

Kecskeméti keseredésmentes konzerv

Korai, gyors érésfolyású, fő - és másodvetésre is alkalmas. Genetikailag keseredésmentes, tiszta nővirágú. Termése középzöld, hengeres, apró szemölcsökkel, középerős növekedésű. Mézgás varasodásra ellenálló, uborka mozaikvírusra és lisztharmatra toleráns.



kategória: 4



Joker F1

Szabadföldi termesztésre ajánlott, túlnyomórészt nővirágú saláta-uborka-hibrid. Betegségellenállósága miatt lombját sokáig megtartja, a fagyokig szedhető. Peronoszpórával, lisztharmattal és uborka mozaikvírussal szemben ellenálló. Kiváló ízű uborkasaláta készíthető belőle.

kategória: 3



A bőr szépsége

A uborkák hűsítő és nyugtató hatással rendelkeznek, ami helyileg alkalmazva csökkenti a duzzanatokat, és enyhíti az irritációt, illetve a gyulladást. Ennek megfelelően uborkakarikákkal hatékonyan lehet kezelni a reggelente puffadt szemkörnyéket, akár csak a napozás közben elszenvedett leégést.

A csontok egészsége

Az elmúlt évtizedekben egyre inkább felismerte a tudomány, hogy a K-vitamin fontos szerepet tölt be a csontok egészsége szempontjából, márpedig 100 gramm uborka a napi ajánlott bevitel mintegy ötödét tartalmazza. Egy korábbi tanulmány szerint K-vitamin-bevitellel csökkenthető a csonttörések kockázata, egyben a D-vitaminnal együtt növelhető általa a csontsűrűség, valamint pozitívan hat a kalcium egyensúlyára a szervezetben.



Zita F1

Szabadföldi termesztésre kiváló, betegségellenálló konzervuborka fajta. Lombját sokáig megtartja, túlnyomórészt nővirágú. Termése mérsékelten szemölcsös, keseredésmentes, ropogós húsú. Csemege és kovászos uborkának is kiválóan alkalmas.

kategória: 3

Zengő F1

Korai érésű, világoszöld alapon sötétzölden csíkozott görögdinnye. Termései 7-10 kg átlagsúlyúak, szabályos gömb alakúak. Héja kifejezetten vékony. Húsa tömör, sötétpiros, kellemesen édes. Elsősorban szabadföldi termesztésre ajánljuk. Fuzárium 0 és 1 rasszára ellenálló fajta.



Sugar baby

Fóliaalagutas termesztésre, valamint korai szabadföldi termesztésre alkalmas. Termései igen tetszetősek, 3-4 kg tömegűek. A héj sötétzöld, világosabb zöld márványozott. Húsa vérvörös, omlós, igen jó minőségű.



Topáz

Igen korai érésű, turkesztán típusú dinnye. Termése gömbölyű, felszíne erősen cseres. Héja éretlenül zöld, megérve sárga. Átlagos tömege 1,2-1,5 kg. Húsa zöldesfehér színű, vastag, édes, lédús. Magürege kicsi. Hagyományos szabadföldi termesztés mellett fóliás talajtakarással és hajtásban is kiváló.



Tétényi csereshéjú

Különlegesen finom, középkorai érésű sárgadinnye. Termése gömbölyű, enyhén gerezdes, húsa élénk narancsszínű, lédús, fűszeres, finom zamatú. Héja zöldessárga, cseres, tömege 0,8-1 kg. Fólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas.



Muskotály

Különlegesen finom, üdítő ízű sárgadinnye. Húsa világoszöld, olvadékony, nagy cukortartalmú, kellemes, sajátos muskotályos zamattal. Termése enyhén lapított, sekélyen gerezdelt gömb, átlagtömege 1 kg.



Crimson Sweet

Középerésű, nagy termésű, csíkos görögdinnye. Jó tápanyagellátottságú talajon 12-14 kg tömegűek. Húsa piros színű, roppanó, édes ízű. Szabadföldi termesztésre ajánljuk helyreveléssel vagy palántaneveléssel. Toleráns a fuzárium és cladosporium 1-2 rasszával szemben.





Albatök

Korai érésű, rövid tenyészidejű, bőtermő, bokor növekedésű fajta. Levelei nagyok, karéjosak. Termése szabályos henger alakú, enyhén bordázott. Tömege 4-5 kg. Húsa zöldefehér, vastag, héja vajszerű, éretten sárga. Friss fogyasztásra és hűtőipari feldolgozásra egyaránt alkalmas.

kategória: 4



Kvetá

Korai érésű, indátlan típusú bokor fajta, nem futó. A termések hengeresek, fehérek, átlagos súlyuk 1,5 kg. Tenyészideje kb. 70 nap a vetéstől az első termés beéréséig. Friss piaci termesztésre ajánljuk.

kategória: 4



Óvári fehér

Szabadföldi termesztésre alkalmas, indátlan típusú csillagtök. Vajszerű termései vastag, fehér húsúak. Termései a szedési időponttól függően 0,15-1,5 kg tömegűek. Tápanyagigényes növény, a fészektárgyázást meghálálja. Friss fogyasztásra és savanyításra is felhasználható.

kategória: 4

Halloween tök

Házikerti termesztésre alkalmas. Erős hajtásrendszert fejlesztő fajta. Termése gömb alakú, barázdált, húsa narancssárga. Egy-egy termés tömege 4-8 kg. Mindenszentek idején érik, így ez a fajta kiválóan alkalmas a halloween tóklámpák készítésére.



Orange

Szabadföldi, házikerti termesztésre alkalmas, középérésű növekedési erélyű fajta. Termése megnyúlt körte alakú, a héj narancsszínű, húsa sötét narancssárga. Rövid idejű tárolásra és friss fogyasztásra alkalmas. Kiváló krémleves alapanyag, sütve igen finom mézédese ízű.

kategória: 2



Nagydobosi

Szabadföldi termesztésre alkalmas, erős hajtásrendszert fejlesztő tradicionális fajta. Termése lapított gömb, a héj világoszürke, a hús narancssárga. Egy-egy termés átlagtömege 4-8 kg. Tárolásra és tartósítóipari felhasználásra alkalmas fajta.

kategória: 4



Connecticut field

kategória: 3



Striato di Napoli

kategória: 4

Black beauty

Sötétzöld színű, guggonülő cukkini. Termesztését szabadföldre javasoljuk, másodvetésre is alkalmas. Biztonságosan termő, nagy hozamú fajta. Hengeres terméseit 10-12 cm hosszúságban érdemes szedni. Friss fogyasztásra, valamint savanyításra is alkalmas.

kategória: 4

Kerek cukkini

Igazi cukkini különlegesség. Termése kerek, világoszöld, enyhén bordázott. Korai, bokornövekedésű. A levelek sötétzöldek, pettyek, foltok nélkül. Fogyasztható salátaként, rántva vagy töltött cukkiniként sütőben megsütve.

kategória: 4



Tondo Chiaro di Toscana

2g

CAT.: 4.

Csíkos cukkini

Bokor típusú, korai fajta. Termése karcsú, hengeres, 20-22 cm hosszú. Héja zöld, világosabb hosszirányú csíkokkal. Nagy termőképességű, egyenletes termésekkel. Tavasz-nyári termesztésre egyaránt alkalmas.



Góliát

Magról termesztendő, nagy termőképességű fajta. Tenyészideje hosszú. Hagymái igen nagyra nőnek, ezért nagyobb tenyésztési területet igényel. Íze kellemesen édeskés, nem csípős. Friss fogyasztásra, saláták készítésére alkalmas.

kategória: 4



Tétényi rubin

Nagy termőképességű, középhosszú tenyészidejű (130-140 nap), igen szép árut adó lilahagyma. Gömb alakú, nyaki része jól záródik. Héjszíne sötétlila, húsa közepesen laza, íze kellemes, enyhén csípős. Felhasználása friss csemegehagymának, salátának.

kategória: 4



Fertődi ezüstfehér

Korai, lapított gömb alakú, magról termesztendő, fehér héjszínű fajta. Rövid ideig tárolható. Kiválóan alkalmas őszi és tavaszi vetésű zöld- és főzömhagyma termesztésre, hideg hajtásra. Az érés előtt lévő hagymafej, ha a talaj felszínére kerül, zöldülhet, ezért enyhe bakháztást ajánljuk.

kategória: 4



Sonkahagyma

Különleges salátahagyma. Lombozata élénkzöld, viaszréteggel közepesen bevont. A hagymatest hengeres alakú, héja közepvastag, sötétsárga színű. Húsa tömött, fehér. Közepesen tárolható. Friss fogyasztásra, és salátaként egyaránt alkalmas.

kategória: 4



Long red Florence

Hengeres hagymatestű, lila héjszínű salátahagyma. Rózsaszín húsú, enyhén csípős ízű. Erőteljes fejlődésű, nehezen megy magyszárba. Friss fogyasztás mellett tárolásra is alkalmas.

kategória: 4



Long white Koshigaya

Téli sarjadékhagyma. Hagymája hengeres, ujjnyi vastagságra növekszik. Egész évben friss, ropogós újhagyma szedhető. Csomózott újhagymaként használható. Évelő, tavaszi vetéssel 3-4 évig helyben hagyható. Házikerti termesztésre ajánljuk.

kategória: 4



Tétényi áttelelő

Friss fogyasztásra, de szárításra is alkalmas, nagy hozamú, szabadban áttelelő póréhagyma típus. A növény magassága 60-70 cm, levélszíne középzöld, kékeszöld. Keskeny felálló, a csúcsi részben enyhén visszahajló. Szára középhosszú, vastag, egyenes.

kategória: 4



Vitéz

Kései érésű, nagyon erőteljes magas levézetű, erős gyökérzetű tárolási fajta. Jól hasznosítja a meglévő tápanyagokat. A légköri aszályt, a forró napokat is jól tűri. Termőképessége a ma használt tárolási fajtáknál jelentősen jobb. Alakja és mérete kiegyenlített. Jól tárolható.

kategória: 4

Fertődi vörös

Hosszú típusú sárgarépa. Tenyészideje hosszú, 180-200 nap. Levélzete erős. A répa csapott vállú, lefelé egyenletesen vékonyodó, hegyben végződik. Színe cinóber-vörös, felülete kissé gyűrűzött. Tárolásra és ipari feldolgozásra alkalmas, nagy karotintartalmú fajta.

**Kiváló tápanyagtartalom**

A répa fogyasztása az egyik legjobb béta-karotin forrás az emberi szervezetnek, valamint rengeteg C- és K-vitamin található benne, kálium és élelmi rost. Tartalmaz még foszfort, B6 és E-vitamint, B1 és B2 vitaminokat. Nagyon alacsony a kalóriatartalma, alig van benne zsír és 0 a koleszterin tartalma. Tíz répa szinte teljesen fedezi a felnőttek számára szükséges napi ajánlott rostbevittelt, amivel nagyban segíti a belső szervek és az artériák tisztán tartását, csökkenti a keringési betegségek kockázatát.

**Danwers 126**

Hosszú tenyészidejű, 180-200 nap. Nagy termőképességű, jó minőségű, jól tárolható. Gyökere hosszú, tompa végű. Szabadföldi termesztésre ajánlott. Friss fogyasztásra, feldolgozásra és tárolásra a legjobb fajta.

Rekord

Flakker típusú, erős lombú, tárolási fajta. Hosszú tenyészidejű, keléstől szedésig 160-180 nap. Kiváló termőképességű, egyöntetű narancsvörös színű. Nagy karotín- és szárazanyagtartalmú. Tárolásra és feldolgozásra egyaránt alkalmas.

**Cherifa F1**

Nanti típusú, korai érésű sárgarépa hibrid. Gyökere 18 cm hosszú, 3-3,5 cm körméretű. Jól csomózható, friss piaci fajta, egyöntetű színű és méretű. Termeszthetősége, termőképessége kiváló. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is alkalmas.

Kometa F1

Nagy termőképességű korai hibrid. Alakja hengeres, kissé kúpos végű, nanti típusú. Tetszetős gyökerei friss piaci értékesítésre és tárolásra egyaránt alkalmasak. Magas karotín és cukortartalma kiemeli a többi hibrid közül. Tenyészideje 110-120 nap.

**Vörös óriás**

Flakker típusú, hosszú, széles vállú, sima felületű sárgarépa. Színe mélyvörös. Erőteljes lombja nagy, felálló. Tenyészideje 180-200 nap. Síkművelésben és bakháton is termesztjük. Magas karotín-, cukor- és szárazanyagtartalma miatt a feldolgozóipar kedvelt fajtája.

**Nanti**

Szabadföldi termesztésre ajánlott, korai és másodvetésre is alkalmas, középkorai tenyészidejű (120-130 nap) fajta. Gyökere hengeres, 16-18 cm hosszú, tompa végű, sima. Íze és színe kimagaslóan jó. Friss fogyasztásra, tárolásra egyaránt alkalmas.

Karotela

Nanti típusú, közepesen hosszú, szabályos hengeres formájú, tompa végű, rövid tenyészidejű (100-110 nap) fajta. Vetési ideje a lehető legkorábbi időponttól akár több menetben július közepéig. Íze kiváló, édes, alkalmas rövid idejű tárolásra és mélyhűtőbe fagyasztásra is.





Kinga
Félhosszú típusú, középhosszú tenyészidejű. Kiválóan tárolható, friss fogyasztásra is alkalmas fajta. Egyöntetű, hófehér húsú répatestet fejleszt. Sima felülete révén könnyen tisztítható.

kategória: 4



Korai cukor
Korai, szabadföldi és fólia alatti termesztésre alkalmas fajta. Legkorábban szedhető, tenyészideje mindössze 140-150 nap. Tápanyagigénye nagy, eredményesen laza és középköttőt talajon termesztendő.

kategória: 4



Hosszú
Szabadföldi termesztésre alkalmas, 20-24 cm gyökérhosszúságú fajta. Tenyészideje 200-220 nap. Kiváló termőképessége dús lombbal párosul. Friss fogyasztásra és tárolásra egyaránt alkalmas. Tél alá vehető.

kategória: 4



Hanácká
Lisztharmat toleráns, könnyen termesztendő, félhosszú típusú fajta. Kúp alakú, a hossza 14-17 cm. Tenyészideje 180-200 nap. Levélzete erős, sötétzöld. Friss fogyasztásra és tárolásra is használható. Tél alá vehető.

kategória: 4



Félhosszú
Szabadföldi termesztésre alkalmas, 180-200 nap tenyészidejű fajta. Gyökere fehér színű, vállátmérője 3-4 cm, hosszúsága 20-24 cm. Levélzete erős, sötétzöld. Kiváló termőképességű, géppel is jól szedhető fajta. Friss fogyasztásra és tárolásra egyaránt alkalmas. Tél alá vehető.

kategória: 4



Fertődi félhosszú pasztinák
A gyökér külső része krémszínű, a hús színe fehér, tömött állományú. Szabadföldi termesztésre ajánlott fajta. A pasztinák sok tápanyagot tartalmazó, mélyen művelt, meszes talajt kedveli. A fel nem szedett pasztinákat talajban, állandó helyen tárolhatjuk, mert a fagyokat jól tűri.

kategória: 4



Hegykői
Szabadföldi termesztésre alkalmas, jól tárolható fajta. Vetéstől a betakarításig 180-220 nap a tenyészideje. Gumója közepnagy, szabályos gömb alakú. Felülete sima. Húsa fehér színű, jó minőségű. Friss fogyasztásra és hűtőipari felhasználásra alkalmas fajta.

kategória: 4



Szárzeller
Hazánkban is elterjedően lévő szárzeller típus, melynek nevéből is adódóan a szára fogyasztható. Sötét színű, erős, felálló, ropogós. Sokféleképpen felhasználható. Nyersen vagy különféle konyhai feldolgozással fogyasztható, salátaként vagy párolva.

kategória: 4



Flamingó
Fűtetlen fólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre alkalmas. Gumója nagy, óriás vaj kategória, gömbölyű. Héja világospiros. Húsa fehér, ropogós, nem pudvásodó. Íze kellemes, enyhén csípős. Lombja nagy, középzöld színű.

kategória: 4



Korai piros
Fűtetlen fólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre alkalmas. Rövid tenyészidejű. Lombja kicsi. Gumója gömbölyű, skarlátpiros. Húsa hófehér, héja vékony, pudvásodásra kevésbé hajlamos. Íze kellemes, enyhén csípős.

kategória: 4



Jánosnapi
Középhosszú tenyészidejű (50-70 nap) nyári retek. Gumója nagy, répa alakú, 10-15 cm hosszú. Héja barnássárga, húsa fehér, ropogós. Pudvásodásra nem hajlamos, Lombja nagy, középzöld. Szabadföldi termesztésre ajánljuk.



Korai legjobb
Fűtetlen fólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre alkalmas. Gumója középnagy vagy nagy, kissé megnyúlt gömb alakú. Színe skarlátpiros, héja vékony. Húsa fehér, tömött, kellemes ízű, pudvásodásra nem hajlamos. Levélzete nagyra nő.

kategória: 4



Jégcsap
Korai szabadföldi termesztésre alkalmas. Gyökere jégcsap alakú, színe üvegesen fehér. Pudvásodásra nem hajlamos. Íze kellemes, néha enyhén csípős. Házikerti termesztésre kiváló.



Nero Tondo D'Inverno
Pudvásodásra nem hajlamos őszi retek. Sötétfekete héjú, fehér húsu 200-250 g tömegű gumókat fejleszt. Lombja erős növekedésű, pincében a sárgarépához hasonlóan jól tárolható.

kategória: 4



Róza
Fűtetlen fólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre alkalmas, középhosszú tenyészidejű (30-40 nap) hónapos retek. Lombozata nagy, középzöld. Gumója nagy, 4,5-5 cm átmérőjű, piros. Gömb vagy lapított gömb alakú. Húsa fehér, héja vékony. Pudvásodásra nem hajlamos.



Müncheni sör
Hosszú tenyészidejű (100-110 nap), jól tárolható őszi fajta, de nyári termesztésre is alkalmas. Sötétzöld lombú, gumója széles vállú, kúp alakú. Húsa fehér színű, igen ízletes. Nem pudvásodik. C-vitaminban gazdag.



Slovana
Fűtetlen fólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre alkalmas, tenyészideje 32-35 nap. Gumója nagy, hosszúkás alakú, 10 cm hosszú és a felső 3/4 része piros, az alsó pedig fehér.

kategória: 4





Hogyan fogyasszuk?

A kelkáposztát nem javasolt nyersen fogyasztani. Akár levest, akár főzeléket – de hús mellé párolva is elkészíthetjük – készítünk ebből a zöldségből, mindig csak roppanósan puhára főzzük, azaz ne főzzük, ne pároljuk túl hosszú ideig, hogy a tápanyagtartalma megmaradjon, és így kifejthesse a pozitív hatásait. A kelkáposzta enzimatív aktivitását fokozhatjuk, ha fokhagymával és egy kevés olívaolajjal készítjük azt el. A benne lévő enzimek így még jobban hasznosulnak, és így ki tudja fejteni az immunfokozó tulajdonságait.

Vertus

Késői, szabadföldi termesztésre alkalmas. Elsősorban másodvetésként termesztendő. Nagy termőképességű fajta. Levélzete világoszöld, finoman hólyagosított. A fejek gömb alakúak, közepesen kemények, 1,3-1,6 kg-osak. Téli tárolásra és friss fogyasztásra is felhasználható.



kategória: 4

Polár

Kerek, édes, ropogós



kategória: 4

Polár

Késői, nagy termőképességű fajta. Tenyészideje kiültetéstől 145-155 nap. A fej lapított, szürkészöld színű, nem reped, átlagsúlya 3-4 kg. Torzsája közepes nagyságú. Friss fogyasztásra és tárolásra egyaránt alkalmas.

Szentesi lapos



Szentesi lapos

Őszi termesztésre alkalmas, nagy termőképességű fajta. Tenyészideje a vetéstől a betakarításig 120-130 nap. Torzsája közepes nagyságú. A fej lapított gömb alakú, zöldesfehér színű, átlagsúlya 1,5-2 kg. Friss fogyasztásra, tartósítóiipari felhasználásra és savanyításra alkalmas.

Júniusi óriás

Frisspiaci célú, korai betakarításra javasolt, átlagosan 0,6-1,2 kg súlyú fejes káposzta. Korai szabadföldi termesztésre és másodvetésre alkalmas. A fej gömbölyű, kemény. Levélzete világoszöld, torzsája rövid. Tenyészideje a kiültetéstől a betakarításig 60-70 nap.

kategória: 4



Rakéta



kategória: 4

Rakéta

Korai szabadföldi és fűtetlen fólia alatti termesztésre ajánlott fajta. A fej kissé megnyúlt, kicsi és zöld színű, keresztmetszetben halványsárga. Friss fogyasztásra alkalmas.

Rufus

Középkorai, tenyészideje 100-120 nap. A fej sötétlila, megnyúlt gömb alakú, átlagos súlya 1,3-2 kg. Termőképessége jó és a termések egyöntetűek. Friss fogyasztásra és tárolásra egyaránt alkalmas.

kategória: 4





Szentesi fólíás kék

Hideghajtásra alkalmas, rövid tenyészidejénél fogva előveteményként is termesztendő. Gumója gömb alakú, kékeslila. A hideget jól tűri, felmagzásra nem hajlamos. Előnyös tulajdonsága, hogy nem fásodik és nem reped.



Violeta

Szabadföldi, őszi termesztésre ajánlott. Igen nagy termőképességű, jó minőségű fajta. Gumója kissé lapított, mélykék, 15-20 cm átmérőjű. Repedésre nem hajlamos. Friss fogyasztásra és tartósítóiipari célokra használható fel.



Szentesi fehér

Hidegfólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre alkalmas fajta. Gumója igen tetszetős, kissé lapított, repedésre nem hajlamos, zöldesfehér színű. Friss fogyasztásra alkalmas.



Gigant

Késői érésű, szabadföldi termesztésre alkalmas fajta. Gumója fehér, kifejezetten nagy, melyeknek mérete a 3-5 kg-ot is elérheti. Nem fásodik. Friss fogyasztásra alkalmas.



Beta

Korai, fűtetlen fólíás hajtásra és korai szabadföldi termesztésre alkalmas. Tenyészideje 120-130 nap. A fej fehér és tömör, a levelek a virágzatot részben takarják. Házikerti termesztésre ajánljuk.

Suprimax

Késő nyári, kora őszi típus. Erőteljes növekedésű, kiváló levéltakarás jellemzi. A melegre nem érzékeny. Tenyészideje 80-100 nap. Friss fogyasztásra, fagyasztásra alkalmas.



Hogyan építhetünk minél több kelbimbót étrendünkbe?

Először is fontos tudni, hogy érdemesebb kisebb és a frissebb kelbimbókat választanunk, ezeknek ugyanis édesebb az ízük, és nem fordul elő, hogy fásak lennének, míg a nagyobbaknál ez megeshet. Mindig külön zacskóban tároljuk a hűtőszekrényben. Érdemes azonban inkább frissen fogyasztani: minél frissebb ugyanis a kelbimbó, annál finomabb.

Az elkészítéskor nagyon fontos még az is, hogy nem szabad túlfőzni: veszít a tápértékéből, és ekkor erősödik fel a jellegzetes keserűsége. A legjobb, ha nem főzzük, hanem a sütőben megsütjük - ehhez találjunk szőlőt, diót és balzsamecetet.



Brüsszeli félmagas

Középhosszú tenyészidejű, intenzív növekedésű, erőteljes szárát fejlesztő fajta. Tömör sötétzöld bimbókat nevel a levelek hálójában a tenyészidő végére. Bimbói gömbölyűek, kézzel könnyen betakaríthatóak. Friss fogyasztásra és fagyasztásra egyaránt alkalmas.



Calabrese

Közepes tenyészidejű sok oldalrószt fejlesztő brokkoli. Rózsái szürkészöld színűek. Csak öntözött körülmények között termesztendő eredményesen. A mély rétegű, jó szerkezetű nitrogénben gazdag talajt kedveli. Friss fogyasztásra és mélyhűtésre egyaránt alkalmas.



Téli vajfej

Őszi vetésű, palántaként áttelelő saláta fajta. A fej tetszetős közép-zöld színű, tavasszal korán fejeseedik. A fej közepes nagyságú, tömött, jól záródó. A hideget nagyon jól tűri.

kategória: 4



Great lakes

Középkorai jégsaláta fajta, tavaszi, nyári és őszi szabadföldi termesztésre. A nagy középzöld salátafejek ropogós, kemény levelekből állnak. Frissességét tovább megőrzi, mint a hagyományos saláták, nehezebben magzik fel.

kategória: 4



Kobak

Rövid tenyészidejű fajta. Levellei igen finom szerkezetűek, sárgászöld színűek. A fej 25-30 dkg tömegű, jól záródó. Magszárképzésre nem hajlamos, az egyik legjobb ízű fajta. Friss fogyasztásra ajánljuk.

kategória: 4

Május királya

Korai, szabadföldi fajta. Későn fejleszt magszárat, ezért őszi és tavaszi fólia alatti hajtásra alkalmas. Középnagy, jól záródó, kemény fejet képez. Színe középzöld. Elsősorban házikerti termesztésre ajánljuk.

kategória: 4



Lolla rossa

Jellegzetes Lolla-típusú szabadföldi termesztésre alkalmas, fodros levelű tépősaláta, ezért fejet nem fejleszt. Színe középbordó, nem fakul ki. Levei nem keserűek, friss zöldsalátaként, illetve vegyes saláták készítésére alkalmas.

kategória: 4





Rukkola
Gyors növekedésű, vitamindús, levélzöldség. A levelek bársonyosan simák, kissé csipkézett szélekkel. Felhasználhatjuk salátamixekhez, de önmagában is fogyaszthatjuk. Egy szezonban akár 4-6-szor is szedhető.



Madársaláta
Kis termetű, korai salátanövény. Galambbegy salátának is nevezik. Nagyon könnyű termeszteni. Szórva vetéssel tavasztól-őszig szakaszosan vethető. Magas a C-vitamin tartalma. Már 3-5 cm-es növénymagasságtól szedhető.

Saga F1
Középkorai, friss fogyasztásra és ipari feldolgozásra ajánlott spenót hibrid. Nagy termőképességű, gyors növekedésű fajta. Levelei szögletes-tojásdad alakúak, mélyzöld színűek. Peronoszpóra rezisztens. Kézi vagy gépi betakarításra alkalmas.



A spenót
A spenót jól emészthető, alacsony kalóriatartalmú, ezért fogyókúrázóknak, diétázóknak is nagyszerű eledel lehet. Vitaminokban, antioxidánsokban, különösen a K-, az A-, B2-, B6-, E- és C-vitaminokban, valamint mangánban, folsavban, vasban és magnéziumban gazdag. Gyakorlatilag az egyetlen természetes folsav- és vasforrás!



Pallagi nagylevelű
Évelő, egyszerű módszerekkel termesztendő zöldség. Levelei vastagok, lándzsa alakúak. Magja apró, nehezen csírázik, ezért csak kifejezetten jól előkészített magágyba szabad vetni. A tenyészidő alatt 2-3 alkalommal szedhetjük a leveleket. Öntözve, fejtrágyázva 3-4 évig maradhat egy helyen. Szabadföldi és fóliás termesztésre egyaránt ajánljuk.



Popey
Nagy termőképességű, üzemi és házikerti termesztésre alkalmas. Szára felálló, hosszú. Levele közepzöld színű, sima, kemény, vastag. Friss fogyasztásra, gyorsfagyasztásra egyaránt alkalmas. Korai szabadföldi termesztésre javasolt.



Mángold
Leveleit főzelékként fogyasztjuk. Korai, tenyészideje 60 nap. C-vitamin és ásványianyag-tartalma jelentős. Többször szedhetjük, de 1/3-nál többet ne szedjünk le egyszerre a leveleiből!



Matador
Tavaszi - őszi vetéssel egyaránt termesztendő, gyors növekedésű, nagylevelű fajta. Nagyon jó hidegtűrő, át is teletethető, későn megy magszárba. Friss fogyasztásra, illetve fagyasztásra egyaránt használható.





Bíborhenger

Korai és másodvetésben természetű henger alakú, csapott vállú cékla. 90-110 napos tenyészidejű. Húsa sötétvörös színű, a gyűrűk alig látszanak. Nagy termőképességű, a hazai viszonyokhoz jól alkalmazkodott fajta. Jól szeletelhető, ipari feldolgozásra is alkalmas.

kategória: 4



Rubin

Rövid tenyészidejű (90-110 nap) fajta. Fő és másodvetésként egyaránt természetű. A répa szabályos gömb alakú, középnagy. Előnyös tulajdonsága az egyöntetű intenzív vörös belső szín. Konzervipari célokra, valamint színezőanyag előállítására alkalmas.

kategória: 4

Kecskeméti lila

Fólia alatti termesztésre javasolt, de szabadföldön is eredményesen természetű fajta. Középkorai érésű. Az első termések a vetéstől számítva 130-135 napra szedhetők. A növény sűrű, zárt bokrot képez. Húsa halvány krémszínű. Friss fogyasztásra és konzervipari célra alkalmas.

kategória: 4



Kecskeméti lila

1g

CAT.: 4.



Tudtad-e?

Veled is előfordult már, hogy nem sikerült a padlizsánkrém, keserű, vagy barna színű lett? Legközelebb már biztos nem lesz ilyen gondod, ha elolvasod ezt a bejegyzést.

Csak olyan padlizsánt vásároljunk, amelynek szép fényes a héja, és ha ujjunkkal benyomjuk, akkor nem marad mélyedés a helyén. A legjobbak a körülbelül 5-9 cm átmérőjű darabok. Az ennél nagyobb példányok belseje üreges lehet, sok lehet bennük a barnás mag, amitől az ízük már kesernyés. A padlizsán zöld kocsányos szárát sütés előtt mindig távolítsuk el. Egyrészt mérgező, másfelől pedig kesernyés ízt ad. Ha egészben sütjük, akkor mindenképpen szurkáljuk meg egy faviállal, mert különben szétrepedhet, felrobbanhat. A fém eszközök használata elszínezi a padlizsánt és keserűvé teszi, de a kerámiabevonatú kés például már használható.





Kakukkfű

Évelő félcserje, melegigényes, fényigényes, szárazságtűrő. Palántáról neveljük, mert lassan fejlődik, virágzaskor szedjük, lehet tőosztással, dugványozással szaporítható. Húsokhoz, levesekhez, főzelékekhez, savanyúsághoz kiváló. Köhögéscsillapító, fertőtlenítő, gomba, baktériumölő, fürdővízben frissítő hatású.

kategória: 4

Majoranna

Egy éves, lágyszárú, melegigényes, fényigényes, vízigényes növény. Vetés után tömörítjük, 3-4 hétig csírázik, ezért palántázással szaporítjuk. Cserépben is termesztendő. Levesekhez, vadakhoz, frissen sültetekhez, főzelékekhez ajánljuk. Nyugtató hatású, gyomor-, bél- és epebántalmakra ajánlott.

kategória: 4



Koriander

Egy éves lágyszárú, közepes hőigényű, fényigényes, közepes vízigényű növény. Csírázása elhúzódik, rövid tenyészidejű, a terméseket teljes érében szedjük 2-3 alkalommal. Káposztához, sült húshoz, töltelékbe, levelét zöldséglevésbe ajánljuk. Javasoljuk gyomor, bélbántalmakra, illóolaját reumára. Szélhajtó hatású.

kategória: 4

Kapor

Egy éves, lágyszárú, napos, meleg helyet kedvelő növény. Szakaszosan vessük, balkonládában is termesztendő. Felhasználható savanyúságokhoz, főzelékekhez, húsokhoz, süteményekhez. Kiváló görcsoldó, szélhajtó, vizelethajtó hatású.

kategória: 4



Simalevelű

Sötétzöld, dús lombú fajta, sima levelzettel. Viszonylag gyorsan növekszik, jól bírja a többszöri vágást. Áttelel, de a töveket késő ősszel fel is szedhetjük, és becserepezve hajthatjuk. Így a tél folyamán is szedhető. Többet terem, ha a hajtáshoz augusztus elején vetjük szabadföldbe. Kelésig naponta öntözzük. Ősszel főlíát húzunk fölé. Hidegtalak, szendvicsek elengedhetetlen díszítője.

kategória: 4



Citromfű

Évelő meleg-, fényigényes, szárazságtűrő félcserje, meszes talajra. 1. évben télen takarni kell. Ősszel is vethető, tőosztással is szaporítható. Salátákhoz, gyümölcslevesekhez, szárnyasokhoz, vadakhoz, süteményekhez Nyugtató, görcsoldó, alvászavar kezelésére ajánljuk.

kategória: 4



Metélőhagyma

Intenzíven sarjadzó évelő növény. Cserépben is hajtható. Levelei egész télen folyamatosan szedhetők. Hazánkban teljesen télálló. Fényigénye mérsékelt, félárnyékban is termesztendő. Friss fogyasztásra, ételek fűszerezésére kiválóan alkalmas.



kategória: 4

Mohafodrozatú

Lombozata dús, tömött. Levelzete erősen fodrozott. A gyökéretrezelem-től igénytelenebb a talajjal szemben. Természetesen a vetés előtt itt is jól el kell munkálni a talajt, hogy egyenletes legyen a kelés. Középhosszú tenyészidejű, hajtatásra is alkalmas. Átteleltethető, szedése folyamatos, időpontját a lomb fejlettsége határozza meg. Ne várjuk meg, hogy az öreg levelek sárguljanak.



kategória: 4



Oregánó

Évelő félcserje, melegigényes, fényigényes, szárazságtűrő. Palántáról neveljük, nyáron ültetjük ki, lehet tőosztással is szaporítani, cserépben is termeszthető. Paradicsomos ételekhez, pizzához, szószekhoz, rostonsültekhez. Emésztéslősegítő, fertőtlenítő hatású.

kategória: 4

Zsázsa

Nagyon könnyen, akár lakásban, ablakban is termeszthető füszernövény. Sűrű, szórt vetése után néhány nappal kikel, és 6-8 cm-esre növe 10 nap múlva szüretelhető, ezért különösen télen jelent friss vitamin utánpótlást, ezenkívül baktériumölő hatású. A friss levelek íze csípős, mustárra, tomára emlékeztet. A zöldségkertbe köztes növényként vetve távol tartja a levéltetveket és a meztelen csigákat. Szendvicsek, párolt húсок ízesítője, de salátákhoz is keverhető.



kategória: 4



Zsálya

Szárazságtűrő, melegigényes, évelő növény. A magokat májusban vessük el jól előkészített talajba, majd a palántákat október elején ültetessük végleges helyükre. Télen takarni kell. Húсокhoz, vadakhoz, sajtokhoz, tésztákhoz ajánljuk. Külsőleg gyulladáscsökkentő, teája izzadásgátló hatású.

kategória: 4



Tárkony

Lágyszárú, évelő, közepes hőmérséklet - és fényigényű, vízigényes növény. Palántáról neveljük, májusban ültetjük ki, tőosztással ősszel vagy tavasszal. Levesekbe, salátához, szószekhoz, sült húсокhoz, főzelékekbe. Vesetisztító, epehajtó, étvágyjavító hatású.

kategória: 4



Bazzalikom

Egy éves, lágyszárú, meleg-, fény- és vízigényes növény. Konyhaablakban cserépben is termeszthető. Használható paradicsomos ételekhez, salátákhoz, főzelékekhez frissen vagy fagyaszta. Görcsoldó, emésztést elősegítő hatású.

kategória: 4



kategória: 4



kategória: 4



Lestyán

Évelő, lágyszárú, közepes hőigényű, fényigényes, vízigényes növény. Téli fagymentes napokon tőosztással is szaporítható. Zeller illatú, levesekbe, salátákba, szárított zöldségként is kiváló. Görcsoldó, emésztést elősegítő, vízajtó, kőhajtó hatású.

kategória: 4





MS Erica

Kiváló termőképességű, középérésű, szuperédes fajta, melynek magas a termési potenciálja. Betegségekkel szemben erősen ellenálló fajta. A termés hossza 20-21 cm, átmérője pedig 5-6 cm. A megfelelő cukortartalom eléréséhez legalább 300 m távolság szükséges a takarmánykukorica vetéstől.

kategória: 2



MS Vega F1

Szuperédes, természetességi tulajdonságai kiválóak. Erős növekedésű, jó szárszilárdságú növény. Az érett cső nagy méretű, átlagos súlya 400-450 g. A fajtánál egyszerűen van jelen a mennyiségi és minőségi kiválóság.

Mirus F1

Szuperédes csemegekukorica. Középerésű (85-90 napos), íze kiváló, roppanó szemek felejthetetlen ízzel. Erős növekedésű, jó szárszilárdságú növény. Fattyasodásra nem hajlamos. Az érett cső nagyméretű, súlya 300 g, szemszíne mély arany-sárga. Kukoricarozsdára és Helminthosporiumos levélfoltosságra rezisztens. Szakaszos vetésre alkalmas.

kategória: 2



May Bico F1

Újdonság a magyar frisspiaci csemegekukorica természetében. Új nemesítésű fajta. Szuperédes fajták között is kiemelkedik a szín és ízvilága. A szemek sárga és fehér színben váltakoznak és különböző ízűek. Egyedülálló szín és ízvilágú csemegekukorica fajta. Korai tenyészidejű, ezért szakaszos vetéssel nyári-őszi természetűre egyaránt alkalmas. Cső hossz kb. 20-22 cm.

kategória: 3





Rege

Szabadföldi termesztésre ajánlott, bőtermő, konzerv típusú bokorbab. Magas növekedésű (45-50 cm). Elágazásai merevek, szárrendszere erős. Levele közepes méretű, középzöld színű. Hüvelye élénksárga, kerek keresztmetszetű. Hossz- és keresztmérete 130x8 mm, szálla- és membránmentes. Hüvelyeit koncentráltan és magasan fejleszti. Korai érésű. Magjai porcelánfehérek. Baktériumos paszulyvésszel szemben ellenálló. Friss fogyasztásra és mélyhűtésre kiválóan alkalmas.


100 g **kategória: 2**



Rézi

Házikerti termesztésre ajánlott, friss piaci célra alkalmas fajta. Bokra 50-55 cm magas. Termései sárga hüvelyűek, oválisak, szállkamentesek. A hüvely mérete 120x10 mm. A folyamatos érés hosszan tartó szedhetőséget biztosít. Vírus és baktériumos zsírfoltossággal szemben ellenálló. Friss fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt alkalmas.

100 g **kategória: 2**



Cerka

Sárga hüvelyei vékonyak, teljesen szállkamentesek, keresztmetszete kör alakú, átmérője kicsi, 7 mm, hossza kb. 10-12 cm. Középkorai, koncentrált érésű, a szemek a hüvelyben rendkívül aprók, fehér színűek, kissé hajlottak. A növény 30-40 cm magas, felfelé törő, merev növekedésű, sötétzöldek a levelei. Friss fogyasztásra és különösen mélyfagyasztásra ajánljuk.

50 g **kategória: 2**



Budai piaci

Korai termesztésre ajánlott házikerti fajta. A bokor 50-55 cm magasra nő. Hüvelyei laposak, tetszetős sárga színűek, 160x15x9 mm nagyságúak. Kiváló ízű, szállkamentes fajta. Zsengén szedjük, amikor a szemek még aprók! Magjai fehérek. Konzisztenciájával igen alkalmas a friss piaci igények kielégítésére. Feldolgozásra és mélyhűtésre is alkalmas.

100 g **kategória: 2**



Odir

Sárga, széles hüvelyű, középkorai érésű bokorbab. Hüvelyei 2 cm szélesek, lapítottak, 16 cm hosszúak is lehetnek. Közepes nagyságú magjai fehérek. Tetszetős hüvelyei friss fogyasztásra és fagyasztásra egyaránt alkalmasak.


50 g **kategória: 2**



Carioca

Piros-barnás rajzolatú tarka szárazbab. Kifejtő babként is használják. Igen bőtermő 45-50 cm magas bokrot fejlesztő fajta. Hüvelyei pirosan címosak, szélesek, 14-15 cm hosszúságúak. Magja nagy, könnyen fejthető gömbölyded formájú.

kategória: 2



Zalán

2-4 m-re is megnövő, támrendszert igénylő, nagy szemű, tarka, Limabab. Kifejlett zsenge magja a zöldbabhoz, száraz magja pedig az étkezési szárazbabhoz hasonlóan készíthető el. Kiváló termőképességű. A növény folyamatosan virágzik, köt termést, ezért folyamatosan szedhető. A hüvely görbülő kard alakú, 10-12 cm hosszú, 2,5 cm széles, benne 3-4 lapos mag található. Szárazságtűrő, betegségellenálló fajta.

kategória: 2

Velox

Házikerti zöldbab termesztésre alkalmas sárgahüvelyű futóbab. A növény magassága elérheti a 200-250 cm-t is. Hüvelyei 18-20 cm hosszúak, laposak, szálkamentesek. Közepes nagyságú magjai fehér színűek. Középérésű fajta. Tetszetős hüvelyei friss fogyasztásra és fagyaszásra egyaránt alkalmasak.

kategória: 2



kategória: 2



Saxa

Szabadföldi termesztésre alkalmas, bőtermő, zöld hüvelyű bokorbab. A bokor magassága megfelelő tápanyag és vízellátás mellett 45-50 cm. Szárrendszere igen erős. Hüvelyeit magasan fejleszti, koncentráltan érő. Termése zsenge, szálkamentes, 120x8 mm nagyságú. Igen bőtermő, középérésű. Fenékedéssel, baktériumos zsírfoltossággal és a bab mozaikvírussal szemben ellenálló. Konzerv- és hűtőipari feldolgozásra is alkalmas.



Borlotto

Késői érésű futóbab. A növény magassága elérheti a 250-300 cm-t is, támasztékot (kerítés vagy karó) igényel. Kiválóan alkalmas kifejtő- és szárazbabnak is. A hüvely sárgászöld színű, sötétpiros csíkokkal, középhosszú, 6-8 db szemmel. A szemek oválisak, rózsaszínek, sötétpiros csíkokkal. A tenészsídeje 85 nap.

kategória: 2



Inka

Pintó típusú tarkabab. Bokor növekedésű, ostorosodásra hajlamos. Hüvelye éretlen állapotban sötétzöld színű, az érés előrehaladtával cirmos, éretten szalmasárga. Hossza 7-10 cm, benne 4-6 mag fejlődik. A mag halvány drapp alapon barna márványozottságú. Tenyészideje 115 nap. Jó termőképességű fajta. Szárazbabbként és kifejtőbabbként is felhasználható.

kategória: 2



Euréka

Fehér színű, kifejezetten nagy szemű (Zalán), bokor növekedésű fajta. Szára erős, a növény 35-40 cm magas. Kiváló termőképességű, betegségekkel szemben ellenálló. Kifejtő- és szárazbabbként egyaránt használható. Íze kitűnő, főzőképessége jó. Friss fogyasztásra, illetve ipari célra egyaránt alkalmas.



kategória: 2



Zenit

Szárazbabbként fogyasztható fehér gyöngybab. Merev szárú, többemeletes bokrot képez. Hüvelyei 7-8 cm hosszúak, benne 5-6 mag fejlődik. Gyorsan, egyenletesen fővő, jó ízű fajta. Az ország egész területén eredményesen termesztethető. Betegségekre nem fogékony. Tenyészideje rövid, 100-110 nap.


kategória: 2



Carmen

Üzemi és házikerti termesztésre alkalmas bokorbab. Bokra magas, 40 cm fölötti. Levelei középzöldek, nagyok. 15-20 cm hosszú hüvelyeiben 6-7 bordó színű mag fejlődik. Közepes tenyészidejű, jó termőképességű fajta. Babfenéssel szemben ellenálló. Chilibabbként, salátababbként való felhasználása egyre elterjedtebb.

kategória: 2



Kelvedon csodája

Nagy szemű, középkorai érésű. Kiváló minőségű, többszöri szedéssel jó terméseredményt adó velőborsó. Sötétzöld hüvelyekben 6-8 szem fejlődik. Igen jóízű, piacos terméseit friss fogyasztásra és feldolgozásra ajánljuk.

Rajnai törpe

Korai érésű kifejtő, a mostohább viszonyokat is jól tűró fajta. A növény magassága 35-40 cm. Hüvelyei 7-8 cm-esek, melyekben 9 sötétzöld szem fejlődik. Igen korai és szakaszos vetésre is kiválóan alkalmas. Friss fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt ajánljuk.

Giant sugar

Nagyon korai, élénkzöldszínű cukorborsó. A hüvelyek 11-12 cm hosszúak, százkamentesek, így zsenge állapotban hüvelyestől is fogyasztható. A növény erős növekedésű, 85 cm magas, így támrendszer, háló vagy kordon biztosítása szükséges. Fogyasztható nyersen salátákba, párolva vagy főzve köretként. Fagyasztásra is alkalmas.

Garai korai

A rajnai törpe fajtát érésidejében 4-5 nappal megelőző, igen korai fajta. A növény magassága 50-60 cm. Hüvelye egyenes, tompa végű, 6-7 szem mag fejlődik benne. Folyamatos szedés érdekében javasolt a szakaszos vetés.

TÉL ALÁ
VETHETŐ!



Farmer

Középerésű borsófajta. Egyenes, hosszú hüvelyekben 9-10 nagy méretű szem fejlődik. Kiváló ízű, házikerti termesztésre alkalmas. Megbízhatóan terem. Friss fogyasztásra és fagyasztásra egyaránt alkalmas.

Korvin

Nagyon korai, kimondottan bőtermő és nagy szemű fajta. Tompa hüvelyben 6-7 sötétzöld 9 mm nagyságú szemet nevel. Erőteljes lombotató fuzárium-ellenálló fajta.

Trend

Kiváló ízű, középerésű fajta. Sötétzöld hüvelyekben 6-8 közepes méretű szem fejlődik. Magasszintű liszttharmat rezisztencia jellemzi. Koncentrált érésű, egy nóduszon három, esetenként négy hüvelyt hoz. Friss fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt alkalmas.

Villó

Nagy, hosszú hüvelyű és nagy szemméretű kései fajta. A liszttharmat és fuzáriummal szemben ellenálló, ami a kései érés csoport esetén különösen fontos, mert ebben az időszakban a melegebb nappalok miatt ezek a gombák nagy mértékben károsítják a borsót.



kategória: 2

Árnyéktűrő

10% Angol perje, 10% Bokros vörös csenkesz, 10% Réti perje, 70% Vörös csenkesz. Fás, árnyékos területű kertek füvesítésére ajánljuk ezt a fűmagkeveréket. A keverékben lévő fűfajok alkalmazkodnak a kisebb fényviszonyokhoz, a kevesebb csapadékhoz, így az árnyékos területeken is szép, dús állományt kapunk.

**Szárazságtűrő**

20% Angol perje, 40% Vörös csenkesz, 40% Nádkéjú csenkesz. A magyarországi szeszélyes éghajlathoz alkalmazkodó, a nyári hőséget is elviselő, a kedvezőtlenebb viszonyok között is üdezőld pázsitot adó keverék. Az öntözést meghálálja, de nem igényli a túl gyakori gondozást. A keverékben lévő fűfajok közül a helyi talajhoz és éghajlati viszonyokhoz legjobban alkalmazkodók szaporodnak el, ezzel biztosítva, hogy kertünk nyár végén is szép, zöld, és ne kiégett sárga legyen.

**Taposást tűrő**

10% Réti perje, 20% Bokros vörös csenkesz, 35% Angol perje, 35% Vörös csenkesz. Sokat használt kertek, udvarok füvesítésére ajánljuk ezt a keveréket, kiváló a gyakran taposott, kikopott területek pótlására is. A keveréket erős gyökérzetű, sokat bíró fűvek alkotják. A kelés utáni időszakban, amíg a fűvek gyökérzete meg nem erősödik, kímélni kell, hogy később sokáig sűrű és szép maradjon.

**Pázsit**

5% Céna tippán, 25% Angolperje, 30% Bokros vörös csenkesz, 40% Vörös csenkesz. A pázsitkeveréket a gondozott díszkertek füvesítésére ajánljuk, vele szép, zárt, üde zöld pázsitot kapunk. A pázsit rendszeres öntözést és nyírást igényel.

Sport

25% Angolperje, 30% Bokros vörös csenkesz, 45% Vörös csenkesz. A Sport keveréket udvarok és gyakran használt kertek, sportolásra használt területek füvesítésére ajánljuk, vele erős, könnyen kezelhető fűvet kapunk. A rendszeres öntözéssel és nyírással hosszasan élvezhetjük a kert örömeit.

**Nyírást ritkán igénylő**

25% Céna tippán, 25% Réti perje, 50% Vörös csenkesz. A legszebb pázsitra vágyó, de kevés idővel rendelkezők részére alakítottuk ki ezt a keveréket, akik szép kertre vágnak és azt gyakran öntözik. A rendszeres öntözés hatására a fű nagyon gyorsan nő, így aki szép pázsitot akar, szinte hetente kell nyírnia. A keverékben lévő fűfajok gyönyörű, de lassan növekvő, dús, sűrű állományt alkotnak, ezért elegendő kevesebb számú fűnyírás is.



ZKIvetőmag